


Mazowieckie	269	5,01	334	6,17	263	4,85	2	0,8
Opolskie	22	2,22	15	1,52	15	1,53	4	26,7
Podkarpackie	29	1,34	34	1,60	11	0,52	4	36,4
Podlaskie	16	1,35	22	1,87	12	1,02	8	66,7
Pomorskie	75	3,19	79	3,38	59	2,51	3	5,1
Śląskie	179	3,94	217	4,80	49	1,09	16	32,7
Świętokrzyskie	13	1,00	15	1,21	0	-	0	-
Warmińsko-Mazurskie	26	1,78	31	2,17	19	1,34	9	47,4
Wielkopolskie	138	3,95	114	3,26	77	2,20	41	53,2
Zachodniopomorskie	57	3,31	56	3,30	36	2,13	13	36,1
Brak danych	90	-	125	-	-	-	-	-
POLSKA	1298	3,38	1498	3,90	938	2,45	154	16,4

N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Trend zakażeń HIV wg wieku i płci osób zakażonych zgłoszonych w latach 2018-2019*



Rycina 2 Rozkład wieku i płci osób zakażonych HIV w latach 2018-2019

* dane z 2020 roku są nadal weryfikowane


Tabela 2 Trend zakażeń HIV według najbardziej prawdopodobnej drogi zakażenia wśród osób zgłoszonych w latach 2018-2019*

Droga transmisji	Rok	
	2018	2019
Kontakty seksualne między mężczyznami	312	323
Stosowanie narkotyków w iniekcjach	21	20
Kontakty heteroseksualne	71	88
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko)	2	5
Kontakty seksualne (brak dokładnych danych jakie)	13	24
Inne/brak danych	791	1038
Razem	1210	1498

* dane z 2020 roku są nadal weryfikowane

Zachorowania na AIDS w Polsce w 2020

Zapadalność ogółem w Polsce wynosiła 0,11 przypadki na 100 000 mieszkańców.



Rycina 1 Zapadalność na AIDS na 100 000 mieszkańców w roku 2020 w poszczególnych województwach.

Tabela 1 Liczba zachorowań na AIDS, zapadalność na 100 000 mieszkańców oraz hospitalizacja wg. województw w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 oraz medianą w latach 2015-2018.

Województwo	AIDS (B20-B24)							
	mediana 2015-2018		2019		2020		Hospitalizacja w roku 2020	
	N	Z	N	Z	N	Z	H	%
Dolnośląskie	13	0,45	10	0,34	3	0,10	3	100,0
Kujawsko-Pomorskie	1	0,05	11	0,53	9	0,43	5	55,6
Lubelskie	2	0,07	2	0,09	2	0,10	2	100,0
Lubuskie	2	0,05	2	0,20	1	0,10	1	100,0
Łódzkie	13	0,52	5	0,20	1	0,04	1	100,0
Małopolskie	5	0,13	1	0,03	0	-	0	-
Mazowieckie	11	0,20	5	0,09	4	0,07	2	50,0
Opolskie	4	0,35	3	0,30	3	0,31	2	66,7
Podkarpackie	2	0,07	2	0,09	3	0,14	3	100,0
Podlaskie	6	0,51	6	0,51	1	0,08	1	100,0
Pomorskie	4	0,17	6	0,26	1	0,04	0	-
Śląskie	16	0,35	14	0,31	8	0,18	8	100,0
Świętokrzyskie	1	0,08	2	0,16	1	0,08	1	100,0
Warmińsko-Mazurskie	8	0,56	3	0,21	4	0,28	4	100,0
Wielkopolskie	12	0,33	11	0,31	1	0,03	1	100,0
Zachodniopomorskie	6	0,35	4	0,24	1	0,06	1	100,0
POLSKA	106	0,27	87	0,23	43	0,11	35	81,4

N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Tabela 2 Trend zachorowań na AIDS wg wieku i płci osób zgłoszonych w latach 2018-2019*

Wiek	Kobiety		Mężczyźni	
	2018	2019	2018	2019
15-19	2	0	1	1
20-24	1	0	6	5
25-29	0	2	12	2
30-34	4	2	14	14
35-39	9	2	7	13
40-44	2	3	15	13
45-49	3	3	12	10
50-54	0	0	8	7
55-59	1	2	5	3
60+	3	1	6	4
Razem	25	15	86	72

* dane z 2020 roku są nadal weryfikowane


Tabela 3 Trend zachorowań na AIDS według najbardziej prawdopodobnej drogi zakażenia wśród przypadków zgłoszonych w latach 2018-2019*

Droga transmisji	Rok	
	2018	2019
Kontakty seksualne między mężczyznami	26	17
Stosowanie narkotyków w iniekcjach	10	9
Kontakty heteroseksualne	18	17
Zakażenia wertykalne (matka-dziecko)	1	0
Kontakty seksualne (brak dokładnych danych jakie)	2	2
Inne/brak danych	54	42
Razem	111	87

* dane z 2020 roku są nadal weryfikowane

Zachorowania na kiłę w Polsce w 2020

Zapadalność ogółem w Polsce wynosiła 1,87 przypadków na 100 000 mieszkańców.



Rycina 1 Zapadalność na kiłę na 100 000 mieszkańców w roku 2020 w poszczególnych województwach.

Tabela 1 Liczba zachorowań na kiłę, zapadalność na 100 000 mieszkańców oraz hospitalizacja wg. województw w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 oraz medianą w latach 2015-2018.

Województwo	Kiła (A51-A53)							
	mediana 2015-2018		2019		2020		Hospitalizacja w roku 2020	
	N	Z	N	Z	N	Z	H	%
Dolnośląskie	53	1,82	42	1,45	18	0,62	4	22,2
Kujawsko-Pomorskie	55	2,64	47	2,27	18	0,87	2	11,1
Lubelskie	34	1,57	20	0,95	9	0,43	5	55,6
Lubuskie	26	2,55	25	2,47	13	1,29	0	0,0
Łódzkie	74	2,96	93	3,78	34	1,39	21	61,8
Małopolskie	113	3,33	99	2,91	76	2,23	3	3,9
Mazowieckie	491	9,12	633	11,7	128	2,36	8	6,3
Opolskie	43	4,33	38	3,86	10	1,02	4	40,0
Podkarpackie	25	1,18	38	1,79	10	0,47	4	40,0
Podlaskie	21	1,77	36	3,05	4	0,34	0	0,0
Pomorskie	95	4,09	100	4,28	109	4,64	24	22,0
Śląskie	112	2,45	145	3,21	68	1,51	24	35,3
Świętokrzyskie	19	1,49	9	0,73	10	0,81	5	50,0
Warmińsko-Mazurskie	41	2,85	17	1,19	12	0,84	2	16,7
Wielkopolskie	204	5,85	220	6,29	159	4,54	11	6,9
Zachodniopomorskie	45	2,63	55	3,24	38	2,24	6	15,8
POLSKA	1517	3,95	1617	4,21	716	1,87	123	17,2


N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Tabela 2 Liczba zachorowań na kiłę w podziale na postać kliniczną choroby w momencie rozpoznania, współczynnik zapadalności na 100 000 mieszkańców oraz hospitalizacja ogółem wg województw w roku 2020.

Województwo	Kiła (A51:A53)							
	Kiła wczesna (A51)		Kiła późna (A52)		Kiła inna i nieokreślona (A53)		Hospitalizacja ogółem	
	N	Z	N	Z	N	Z	H	%
Dolnośląskie	12	0,41	1	0,03	5	0,17	4	22,2
Kujawsko-Pomorskie	11	0,53	1	0,05	6	0,29	2	11,1
Lubelskie	3	0,14	0	-	6	0,29	5	55,6
Lubuskie	4	0,40	1	0,10	8	0,79	0	-
Łódzkie	17	0,69	2	0,08	15	0,61	21	61,8
Małopolskie	37	1,08	0	-	39	1,14	3	3,9
Mazowieckie	27	0,50	1	0,02	100	1,84	8	6,3
Opolskie	5	0,51	1	0,10	4	0,41	4	40,0
Podkarpackie	6	0,28	0	-	4	0,19	4	40,0
Podlaskie	4	0,34	0	-	0	-	0	-
Pomorskie	67	2,86	15	0,64	27	1,15	24	22,0
Śląskie	40	0,89	2	0,04	26	0,58	24	35,3
Świętokrzyskie	8	0,65	0	-	2	0,16	5	50,0
Warmińsko-Mazurskie	7	0,49	1	0,07	4	0,28	2	16,7
Wielkopolskie	55	1,57	3	0,09	101	2,89	11	6,9
Zachodniopomorskie	23	1,36	6	0,35	9	0,53	6	15,8
POLSKA	326	0,85	34	0,09	356	0,93	123	17,2

N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Trend zachorowań na kiłę wg wieku i płci osób zakażonych zgłoszonych w latach 2018- 2019*




Rycina 2 Rozkład wieku i płci osób chorych na kiłę w latach 2018-2019

* dane z 2020 roku są nadal weryfikowane

Zachorowania na rzeżączkę w Polsce w 2020

Zapadalność ogółem w Polsce wynosiła 0,65 przypadków na 100 000 mieszkańców.




Rycina 1 Zapadalność na rzeżączkę na 100 000 mieszkańców w roku 2020 w poszczególnych województwach

Tabela 1 Liczba zachorowań na rzeżączkę, zapadalność na 100 000 mieszkańców oraz hospitalizacja wg województw w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 oraz medianą w latach 2015-2018.

Województwo	Rzeżączka (A54)							
	mediana 2015-2018		2019		2020		Hospitalizacja w roku 2020	
	N	Z	N	Z	N	Z	H	%
Dolnośląskie	13	0,43	15	0,52	4	0,14	1	25,0
Kujawsko-Pomorskie	23	1,08	20	0,96	13	0,63	1	7,7
Lubelskie	7	0,30	5	0,24	2	0,10	0	-
Lubuskie	4	0,39	4	0,39	4	0,40	0	-
Łódzkie	13	0,50	19	0,77	9	0,37	0	-
Małopolskie	21	0,61	39	1,15	22	0,64	0	-
Mazowieckie	180	3,36	297	5,49	93	1,71	0	-
Opolskie	3	0,30	1	0,10	0	-	0	-
Podkarpackie	8	0,38	5	0,24	2	0,09	0	-
Podlaskie	9	0,76	18	1,53	6	0,51	0	-
Pomorskie	18	0,78	26	1,11	35	1,49	0	-
Śląskie	24	0,53	17	0,38	7	0,16	2	28,6
Świętokrzyskie	8	0,60	2	0,16	2	0,16	0	-
Warmińsko-Mazurskie	6	0,42	5	0,35	2	0,14	0	-
Wielkopolskie	28	0,80	39	1,12	41	1,17	1	2,4
Zachodniopomorskie	9	0,53	12	0,71	8	0,47	0	-
POLSKA	363	0,94	524	1,37	250	0,65	5	2,0

N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Trend zachorowań na rzeżączkę wg wieku i płci osób zakażonych zgłoszonych w latach 2018-2019*




■ Kobiety - 2018 ■ Kobiety-2018 ■ Mężczyźni-2018 ■ Mężczyźni-2019

Rycina 2 Rozkład wieku i płci osób chorych na rzeżączkę w latach 2018-2019

* dane z 2020 roku są weryfikowane

Zachorowania na nierzęzączkowe zapalenia cewki moczowej, najczęściej wywoływane przez *Chlamydię trachomatis* w Polsce w 2020

Zapadalność ogółem w Polsce wynosiła 0,44 przypadki na 100 000 mieszkańców.




Rycina 1 Zapadalność na chlamydiozę na 100 000 mieszkańców w poszczególnych województwach w roku 2020.

Tabela 1 Liczba zachorowań na chlamydiozę, zapadalność na 100 000 mieszkańców oraz hospitalizacja wg województw w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 oraz medianą w latach 2015-2018.

Województwo	Chlamydia (A56)							
	mediana 2015-2018		2019		2020		Hospitalizacja w roku 2020	
	N	Z	N	Z	N	Z	H	%
Dolnośląskie	7	0,23	6	0,21	2	0,07	0	-
Kujawsko-Pomorskie	6	0,26	1	0,05	2	0,10	0	-
Lubelskie	3	0,14	5	0,24	2	0,10	0	-
Lubuskie	2	0,20	2	0,20	0	-	0	-
Łódzkie	3	0,10	15	0,61	6	0,25	1	16,7
Małopolskie	14	0,40	17	0,50	21	0,62	0	-
Mazowieckie	127	2,36	212	3,92	32	0,59	0	-
Opolskie	3	0,25	4	0,41	1	0,10	0	-
Podkarpackie	2	0,07	6	0,28	0	-	0	-
Podlaskie	12	1,01	23	1,95	11	0,93	0	-
Pomorskie	15	0,65	15	0,64	28	1,19	1	3,6
Śląskie	7	0,14	10	0,22	7	0,16	0	-
Świętokrzyskie	1	0,08	1	0,08	0	-	0	-
Warmińsko-Mazurskie	2	0,14	2	0,14	2	0,14	0	-
Wielkopolskie	58	1,67	94	2,69	38	1,09	1	2,6
Zachodniopomorskie	4	0,20	5	0,29	17	1,00	1	5,9
POLSKA	244	0,63	418	1,09	169	0,44	4	2,4

N – liczba zachorowań; Z- zapadalność na 100 000 mieszkańców; H – liczba hospitalizacji

Trend zachorowań na chlamydię wg wieku i płci osób zakażonych zgłoszonych w latach 2018-2019*



Rycina 2 Rozkład wieku i płci osób chorych na chlamydię w latach 2018-2019

* dane z 2020 roku są weryfikowane